This is an invitation letter for cervical cancer screening. More information: www.cervicalscreening.fi

KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONTA

KUTSU

KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONTAAN

AIKA:
PAIKKA:

SEULONTAKÄYNTI ON SINULLE MAKSUTON

MISTÄ ON KYSE?

Olet saanut tämän kutsun, koska edellisellä kohdunkaulan syövän seulontakerralla näytteessäsi todettiin lievä solumuutos ja/tai papilloomavirus (HPV) -testin tulos oli positiivinen. Kohdunkaulan syöpä kehittyy yleensä hitaasti esiasteiden kautta. Seulontanäytteen avulla mahdollinen syövän esiaste voidaan todeta ja hoitaa niin varhaisessa vaiheessa, että syöpä ei pääse lainkaan kehittymään.

AJANMUUTOS

puh.
puhelinaika
www-osoite

sähköposti

MITÄ SEULONTAKÄYNNILLÄ TAPAHTUU?

Seulontakäynnillä kohdunkaulasta otetaan seulontanäyte (Papa- tai HPV -näyte). Näytettä ei mielellään oteta kuukautisten aikana, mutta muu vuoto ei ole esteenä näytteenotolle. Raskaus, imetys tai kohdunpoisto eivät myöskään ole esteitä osallistumiselle.

MITEN TULOKSISTA ILMOITETAAN?

Testitulos ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisella kirjeellä. Jos näytteestä löytyy poikkeavaa, saat kutsun jatkotutkimuksiin kirjeitse tai puhelimitse.

Tervetuloa seulontaan! Lisätietoja **kohdunkaulaseulonta.fi**

Seulontatiedot kootaan potilasasiakirjoihin, jotka ovat salassa pidettäviä.
Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki

MIKÄ?

Kohdunkaulan syöpä on maailman toiseksi yleisin naisten syöpä. Suomessa todetaan nykyään vuosittain noin 170 uutta kohdunkaulan syöpää. Syöpä kehittyy vuosien kuluessa esiasteiden kautta, kun kohdunkaulan limakalvon solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi. Oireena voi esiintyä ylimääräistä tai yhdynnän jälkeistä veristä vuotoa, mutta yleensä syöpä on oireeton.

Tärkein yksittäinen taustatekijä kohdunkaulan syövän synnyssä on ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n aiheuttama pitkittynyt tulehdus. Pääasiallisesti sukupuoliteitse leviävä HPV-infektio on hyvin yleinen ja yleensä se paranee itsekseen. Joillakin infektio kuitenkin pitkittyy ja sen aiheuttamat solumuutokset voivat edetä syöväksi.

MIKSI?

Kohdunkaulan syövän esiasteet voidaan löytää seulonnan avulla ja hoitaa ennen kuin syöpä pääsee kehittymään. Suurin osa kohdunkaulan syövistä löytyy naisilta, jotka eivät ole osallistuneet seulontoihin. Seulontaan kannattaa aina osallistua, vaikka vastaava tutkimus olisikin tehty lähiaikoina muualla. Seulontakäynti on maksuton!

KENELLE?

Kaikki suomalaiset naiset kutsutaan kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan viiden vuoden välein. Ensimmäinen kutsu tulee yleensä 30-vuotiaana ja viimeinen 65-vuotiaana. Jokaisen naisen olisi siis hyvä osallistua seulontaan. Tautiin voivat sairastua kaikenikäiset naiset eikä seksuaalisella aktiivisuudella, käytetyllä ehkäisymenetelmällä tai sukupuolisella suuntautumisella ole merkitystä. Myöskään raskaus, imetys tai kohdunpoisto eivät estä seulontaan osallistumista. Näytettä ei kuitenkaan mielellään oteta kuukautisten aikana, koska näytteen tulkinta on tällöin hankalampaa.

MITEN?

Seulontakäynnillä hoitaja ottaa seulontanäytteen emättimestä, kohdunsuulta ja kohdunkaulakanavasta. Seulontanäytteenä käytetään irtosolunäytettä eli Papa- tai HPV-näytettä. Näytteenotto voi tuntua pienenä nipistyksenä ja muutaman päivän ajan sen jälkeen saattaa esiintyä tiputteluvuotoa. Viimeistään seulontakäynnin aikana täytetään esitietolomake, johon kirjataan mm. viimeisten kuukautisten ajankohta sekä edellisen näytteenoton ajankohta ja tulos.

TULOS?

Testitulos ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisella kirjeellä kahden kuukauden kuluessa. Yli yhdeksällä kymmenestä vastaus on normaali eli mitään kohdunkaulan solumuutokseen viittaavaa ei ole löytynyt. Jos seulonnasta löytyy poikkeavaa, saat kutsun jatkotutkimuksiin kirjeitse tai puhelimitse. Lähes aina silloinkin kyseessä on lievä muutos, joka ei ole syöpä eikä edes sen esiaste.

Tämän kutsukirjeen seulontaohjelmaa koskevat tiedot
on tuottanut Suomen Syöpärekisteri. www.syöpärekisteri.fi